



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Residência em Medicina de Família e Comunidade – Coreme Pimenta Bueno

**Processo Seletivo para SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS REMANESCENTES DO  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA  
O PERÍODO LETIVO DE 2025 (SETEMBRO)**

**PROVA**

**Questão 1:** Um paciente, proveniente de outro estado, realiza sua primeira consulta em uma Unidade de Saúde da Família. Ele relata febre com início há 2 dias. Após triagem foi direcionado para atendimento médico. Este atendimento está contemplado em qual princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A) Integralidade**
- B) Universalidade**
- C) Equidade**
- D) Descentralização**
- E) Hierarquização**

**Questão 2:** Qual das alternativas abaixo está correta de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde sobre rastreamento de cânceres?

- A) O rastreamento do câncer de colo do útero deve ser feito com exame citológico (Papanicolau) a cada 2 anos em mulheres de 18 a 64 anos.**
- B) O rastreamento do câncer de colo do útero deve ser feito com exame citológico (Papanicolau) a cada 2 anos em mulheres de 18 a 69 anos.**
- C) O rastreamento do câncer de colo do útero deve ser feito com exame citológico (Papanicolau) a cada 3 anos em mulheres de 24 a 64 anos.**
- D) O rastreamento do câncer de colo do útero deve ser feito com exame citológico (Papanicolau) a cada 3 anos em mulheres de 25 a 64 anos.**
- E) O rastreamento do câncer de colo do útero deve ser feito com exame citológico (Papanicolau) a cada 3 anos em mulheres de 25 a 69 anos.**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Questão 3:** Qual das alternativas abaixo está correta de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde sobre rastreamento de cânceres?

- A)** O rastreamento do câncer de mama é recomendado para mulheres com idades entre 40 e 69 anos, realizando mamografia a cada 2 anos.
- B)** O rastreamento do câncer de mama é recomendado para mulheres com idades entre 50 e 69 anos, realizando mamografia a cada 2 anos.
- C)** O rastreamento do câncer de mama é recomendado para mulheres com idades entre 40 e 69 anos, realizando mamografia a cada 3 anos.
- D)** O rastreamento do câncer de mama é recomendado para mulheres com idades entre 50 e 69 anos, realizando mamografia a cada 3 anos.
- E)** nenhuma das alternativas anteriores.

**Questão 4:** Em um município houve redução da taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos. Qual a causa mais provável de alteração desse indicador dentre as alternativas abaixo?

- A)** Aumento do número de casos de doenças crônicas.
- B)** Aumento da expectativa de vida local.
- C)** Melhoria da qualidade do pré-natal da atenção primária.
- D)** Aumento da populacional.
- E)** Nenhuma das alternativas anteriores.

**Questão 5:** Uma estratégia de saúde da família com um total de 3000 habitantes possui 600 pessoas com hipertensão, 300 pessoas com diabetes, 200 crianças e 30 gestantes adscritas em seu território. Qual a prevalência de hipertensos e diabéticos na população desta estratégia?

- A)** Prevalência de 50% de hipertensos e 25% de diabéticos.
- B)** Prevalência de 40% de hipertensos e 20% de diabéticos.
- C)** Prevalência de 30% de hipertensos e 15% de diabéticos.
- D)** Prevalência de 20% de hipertensos e 10% de diabéticos.
- E)** Prevalência de 10% de hipertensos e 5% de diabéticos.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Questão 6:** Quais quadros clínicos podem se apresentar como sintomas depressivos, exigindo investigação cuidadosa para um diagnóstico diferencial segundo o Tratado de Medicina de Família?

- A)** Hipotireoidismo, esquizofrenia, doenças ortopédicas.
- B)** Hipotireoidismo, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência.
- C)** Hipotireoidismo, transtorno bipolar, litíase, demência
- D)** Transtorno bipolar, litíase, climatério.
- E)** Transtorno bipolar, dengue, doenças autoimunes.

**Questão 7:** Durante o exame físico de um paciente, é identificado um nódulo tireoidiano. Qual deve ser a próxima ação a ser tomada?

- A)** Solicitar uma cintilografia da tireoide.
- B)** Encaminhá-lo para um especialista qualificado.
- C)** Acalmá-lo, assegurando que o nódulo é certamente benigno.
- D)** Solicitar uma ultrassonografia da tireoide e medir o nível de hormônio estimulante da tireoide (TSH).
- E)** nenhuma das alternativas anteriores.

**Questão 8: Quais características a baixo sugerem malignidade durante a avaliação de um Nevo Melanocítico (pinta comum, verruga)**

- A)** Simetria, Bordas Regulares, Cor Homogênea, Dimensão menor que 0,5 mm, Crescimento Lento.
- B)** Simetria, Bordas Regulares, Cor Homogênea, Diâmetro superior a 0,5 cm, Crescimento rápido.
- C)** Assimétrico, Bordas Regulares, Cor Homogênea, Dimensão menor que 0,5 mm, Crescimento Lento.
- D)** Assimétrico, Bordas Irregulares, Cor Homogênea, Dimensão menor que 0,5 mm, Crescimento Lento.
- E)** Assimétrico, Bordas Irregulares, Cor Heterogênea, Dimensão maior que 0,5 mm, Crescimento rápido.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Questão 9:** Qual das alternativas abaixo está correta sobre Problemas de Tireoide segundo o Tratado de Medicina de Família?

- A)** Para indivíduos com menos de 60 anos e sem doenças concomitantes, a dose inicial recomendada é de 50 mcg/dia (em pacientes mais jovens, pode-se iniciar diretamente com a dose total).
- B)** Para aqueles com menos de 60 anos ou com doenças associadas, a dose inicial é de 32,5 mcg/dia, sendo os aumentos realizados de maneira cuidadosa, em intervalos de 2 semanas, com incrementos de 12,5 a 25 mcg.
- C)** A levotiroxina deve ser ingerida com água, após uma refeição, entre 30 a 60 minutos após o jantar, não podendo ser ingerida 4 horas após a última refeição.
- D)** Existem evidências que suportem o uso combinado de T3 e T4 no tratamento do hipotireoidismo.
- E)** Em casos de hipotireoidismo subclínico a dose alvo deve ser a mesma que a utilizada no hipotireoidismo pleno.

**Questão 10:** Quais das seguintes atitudes podem contribuir para a redução da pressão arterial?

- 1- Diminuição do peso:** Perda de 10 kg de peso pode reduzir a PAS.
- 2- Dieta Dash:** Consumo de dieta rica em frutas, vegetais e laticínios com baixo teor de gordura.
- 3- Redução do sódio:** Limitar a ingestão de sódio a 2,4 g/dia.
- 4- Atividade física regular:** Prática de exercícios como caminhada por 30 minutos na maioria dos dias da semana.
- 5- Moderação do consumo de álcool:** Limitar o consumo de álcool a dois drinques diários para homens.

**Assinale a alternativa correta:**

- A)** Apenas as alternativas **1** e **3** estão corretas.
- B)** Apenas as alternativas **3** e **4** estão corretas.
- C)** Apenas as alternativas **1, 2 e 5** estão corretas.
- D)** Apenas as alternativas **2, 3 e 4** estão corretas
- E)** Todas as alternativas estão corretas.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Questão 11:** Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa correta:

- A)** O aleitamento exclusivo deve ser mantido até os 6 meses, podendo oferecer água em dias muito quentes.
- B)** Após 4 meses, o leite materno deve ser complementado com fórmula infantil.
- C)** A amamentação deve ser incentivada até 1 ano, sendo desnecessária após esse período.
- D)** O aleitamento exclusivo até os 6 meses reduz o risco de diarreia e infecções respiratórias.
- E)** A introdução alimentar deve ocorrer a partir de 3 meses em crianças com bom ganho ponderal.

**Questão 12:** Durante uma consulta, a mãe de uma criança de 1 ano relata episódios frequentes de febre sem foco aparente. A criança está ativa, com bom estado geral e sem sinais de toxemia. Qual a conduta mais adequada na Atenção Primária a Saúde?

- A)** Prescrever antibiótico empírico de largo espectro.
- B)** Encaminhar para pronto-socorro pediátrico.
- C)** Orientar sinais de alerta e agendar reavaliação.
- D)** Solicitar hemograma e proteína C reativa.
- E)** Prescrever antitérmico por 7 dias e liberar.

**Questão 13:** Em relação ao calendário vacinal da criança na Atenção Primária, é correto afirmar:

- A)** A vacina pentavalente deve ser iniciada aos 4 meses de idade.
- B)** A vacina contra rotavírus pode ser iniciada até os 6 meses.
- C)** A tríplice viral deve ser aplicada a partir dos 12 meses.
- D)** A vacina BCG deve ser aplicada aos 2 meses de idade.
- E)** A vacina contra hepatite B só é obrigatória após 6 meses.

**Questão 14:** Durante o atendimento em uma Unidade de Saúde da Família, uma criança de 10 meses é trazida pela mãe com queixa de tosse há 3 dias, febre baixa e dificuldade para mamar. Ao exame, a criança apresenta FR = 52 irpm, tiragem subcostal leve e ausculta com estertores finos difusos. O estado geral é bom, e a criança está responsável.

Considerando os critérios da classificação de gravidade das infecções respiratórias agudas em crianças, qual deve ser a conduta mais adequada?

- A)** Prescrever antibiótico e encaminhar imediatamente para o hospital.
- B)** Orientar hidratação, manter amamentação e prescrever sintomáticos.
- C)** Encaminhar para unidade de pronto atendimento para oxigenoterapia.
- D)** Diagnosticar como bronquiolite leve e manejar ambulatorialmente com cuidados de suporte.
- E)** Realizar radiografia de tórax para confirmação diagnóstica e definir conduta.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Questão 15:** Uma criança de 5 anos é levada à Unidade de Saúde com queixas de episódios recorrentes de chiado no peito, principalmente à noite e após brincadeiras. A mãe relata uso frequente de salbutamol inalatório, com melhora dos sintomas, mas sem uso regular de outros medicamentos. Qual deve ser a conduta mais apropriada na Atenção Primária?

- A)** Prescrever antibiótico e corticosteroide oral por 10 dias.
- B)** Manter apenas salbutamol em uso conforme necessário, sem tratamento de manutenção.
- C)** Iniciar corticosteroide inalatório de manutenção e manter salbutamol como resgate.
- D)** Solicitar espirometria antes de qualquer conduta terapêutica.
- E)** Encaminhar imediatamente para pneumopediatra.

**Questão 16:** Paciente, 25 anos, apresenta dor abdominal iniciando na região periumbilical, migrando para fossa ilíaca direita, associada a náuseas, vômitos e febre de 38 °C. Ao exame físico, apresenta sensibilidade à palpação em fossa ilíaca direita, sinal de Blumberg positivo e leucocitose de 14.000/mm<sup>3</sup>.

Considerando os Critérios de Alvarado, qual o escore mais próximo para este paciente?

- A)** 3 pontos - baixa probabilidade de apendicite
- B)** 5 pontos - suspeita moderada de apendicite
- C)** 7 pontos - alta probabilidade de apendicite
- D)** 9 pontos - diagnóstico definitivo de apendicite
- E)** 4 pontos – suspeita moderada de apendicite

**Questão 17:** Homem, 54 anos, cirrótico alcoólico, é internado por ascite volumosa. Durante a internação, apresenta febre (38,5 °C), dor abdominal difusa e rebaixamento do nível de consciência. É realizada paracentese diagnóstica, com o seguinte resultado:

\* Contagem de polimorfonucleares (PMN): 320 células/mm<sup>3</sup>

\* Cultura: em andamento

Com base nesses achados, qual é a conduta mais adequada?

- A)** Não tratar, pois o diagnóstico depende de cultura positiva.
- B)** Iniciar antibioticoterapia empírica para peritonite bacteriana espontânea (PBE).
- C)** Solicitar tomografia de abdome para descartar peritonite secundária antes de iniciar tratamento.
- D)** Repetir a paracentese em 48h para confirmar o diagnóstico.
- E)** Realizar apenas albumina EV, sem antibiótico, pois o diagnóstico ainda é duvidoso.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Questão 18:** Mulher, 60 anos, apresenta dor intensa e massa endurecida na região da coxa, logo abaixo do ligamento inguinal, que não se reduz ao toque. Refere náuseas e vômitos.

Considerando anatomia, epidemiologia e risco de complicações, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Hérnias femorais são mais comuns em homens e raramente se estrangulam.
- B)** Hérnias femorais passam acima do ligamento inguinal, lateral ao canal inguinal.
- C)** Hérnias femorais têm alto risco de estrangulamento e geralmente requerem correção cirúrgica urgente.
- D)** Hérnias femorais podem ser facilmente reduzidas em adultos, com baixa chance de complicações.
- E)** Hérnias femorais são sempre assintomáticas e descobertas incidentalmente.

**Questão 19:** Homem, 62 anos, apresenta dor abdominal em quadrante inferior esquerdo, febre e leucocitose. Tomografia de abdome revela abscesso pericólico < 5 cm, sem sinais de peritonite generalizada.

Segundo a classificação de Hinchey, qual estágio melhor descreve este achado?

- A)** Hinchey I
- B)** Hinchey II
- C)** Hinchey III
- D)** Hinchey IV
- E)** Hinchey 0

**Questão 20:** Homem 68 anos, hipertenso, diabético e portador de fibrilação atrial, sem anticoagulação, apresenta dor abdominal intensa de início súbito em mesogástrico.

Ao exame físico taquicardico, sem distensão abdominal e sem sinais de irritação peritoneal.

Hemograma sem alterações significativas, gasometria com acidose metabólica e lactato 6,0 mmol/L. provável diagnóstico é:

- A)** Abdome agudo vascular
- B)** Abdome agudo hemorrágico
- C)** Pancreatite aguda
- D)** Ulcera gástrica
- E)** Apendicite aguda complicada



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Questão 21:** Sobre os tipos de Dispositivo Intrauterino (DIU) e o tempo aproximado de validade de cada um, assinale a alternativa correta:

- A)** O DIU de cobre tem validade de até 10 anos, o DIU de levonorgestrel pode ser utilizado por até 8 anos, e o DIU de prata tem validade de até 8 anos.
- B)** O DIU de cobre tem validade de até 10 anos, o DIU de levonorgestrel pode ser utilizado por até 5 anos, e o DIU de prata tem validade de até 5 anos.
- C)** O DIU de cobre tem validade de até 7 anos, o DIU de levonorgestrel pode ser utilizado por até 5 anos, e o DIU de prata tem validade de até 7 anos.
- D)** O DIU de cobre tem validade de até 7 anos, o DIU de levonorgestrel tem validade de até 5 anos, e o DIU de prata tem validade de até 10 anos.
- E)** O DIU de cobre tem validade de até 5 anos, o DIU de levonorgestrel tem validade de até 5 anos, e o DIU de prata tem validade de até 10 anos.

**Questão 22:** Durante um pré-natal de baixo risco, quais os limites (valor normal esperado) da glicemia de jejum e TOTG (teste oral de tolerância a glicose com 75g)?

- A)** Glicemia de jejum < 92 mg/dl, TOTG pós 1h < 180 mg/dl, TOTG pós 2h < 153 mg/dl
- B)** Glicemia de jejum < 92 mg/dl, TOTG pós 1h < 180 mg/dl, TOTG pós 2h < 160 mg/dl
- C)** Glicemia de jejum < 95 mg/dl, TOTG pós 1h < 200 mg/dl, TOTG pós 2h < 160 mg/dl
- D)** Glicemia de jejum < 125 mg/dl, TOTG pós 1h < 180 mg/dl, TOTG pós 2h < 153 mg/dl
- E)** Glicemia de jejum < 125 mg/dl, TOTG pós 1h < 200 mg/dl, TOTG pós 2h < 153 mg/dl

**Questão 23:** Durante um pré-natal de baixo risco durante a avaliasse a sorologia com detecção de anticorpos específicos das classes IgM e IgG para Toxoplasmose. Assinale a alternativa correta quanto a avaliação dos exames de rastreio de Toxoplasmose com resultado IGG reagente e IGM não reagente?

- A)** Necessário realizar teste de Avidez.
- B)** Encaminhar a paciente para acompanhamento conjunto como pré-natal de alto risco.
- C)** Repetir exame de IGG e IGM trimestralmente.
- D)** Iniciar o tratamento devido a diagnóstico de Toxoplasmose gestacional.
- E)** Não repetir o exame.

**Questão 24:** Paciente 30 anos vem a consulta com queixa de corrimento vaginal grumoso, sem odor e com prurido vaginal. Durante exame especular observa-se fissuras vulvares com placas de cor branca aderidas à parede vaginal. Qual o diagnóstico mais provável?

- A)** Vaginose bacteriana
- B)** Secreção vaginal fisiológica
- C)** Candidíase vaginal
- D)** Sífilis Primária
- E)** Leishmaniose



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Questão 25:** Uma paciente de 50 anos queixa-se de um nódulo na mama direita. A paciente realiza um exame de mamografia com resultado Categoria Birds 2. Qual a interpretação desse exame?

- A)** Exame inconclusivo.
- B)** Exame normal, sem alterações.
- C)** Exame com alterações benignas.
- D)** Exame suspeito de malignidade.
- E)** Exame altamente suspeito de malignidade

# **EDITAL COREME PIMENTA BUENO Nº 01/2025**

No Edital nº 01/2025, que trata do Processo Seletivo para SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS REMANESCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025 (SETEMBRO), publicado em 12/08/2025.

## **GABARITO**

- 1 – B
- 2 – D
- 3 – B
- 4 – C
- 5 – D
- 6 – B
- 7 – D
- 8 – E
- 9 – A
- 10 – E
- 11 – D
- 12 – C
- 13 – C
- 14 – D
- 15 – C
- 16 – C
- 17 – B
- 18 – C
- 19 – A
- 20 – A
- 21 – B
- 22 – A
- 23 – E
- 24 – C
- 25 – C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Pimenta Bueno RO

# EDITAL COREME PIMENTA BUENO Nº 01/2025

## ERRATA 03

No Edital nº 01/2025, que trata do Processo Seletivo para SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS REMANESCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025 (SETEMBRO), publicado em 12/08/2025.

- 1) Atualização do Cronograma de realização das etapas, **leia-se:**

DATA	ETAPA	HORÁRIO
02.09.2025	Recurso acerca do Gabarito Preliminar	Presencial – até as 10h00min horas do dia 02 de setembro de 2025 na Secretaria de Saúde de Pimenta Bueno.
03.09.2025	Divulgação do recurso acerca do Gabarito Preliminar Divulgação do resultado parcial do processo seletivo	10:00h
04.09.2025	Prazo para recursos do resultado parcial do processo seletivo	Presencial – até as 10h00min horas do dia 04 de setembro de 2025 na Secretaria de Saúde de Pimenta Bueno
04.09.2025	Divulgação do resultado final	18h00
05.09.2025	Período de matrícula dos aprovados	08:00h às 12:00h
08.09.2025	Início do ano letivo	07h00

Ficam mantidas todas as demais disposições do referido edital que não foram contempladas por erratas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Pimenta Bueno RO**

# **EDITAL COREME PIMENTA BUENO Nº 01/2025**

**SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS REMANESCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM  
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025 (SETEMBRO) DE ACORDO COM A  
RESOLUÇÃO 01 DE AGOSTO DE 2025 DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MEDICA (CNRM).**

## **FICHA DE RECURSO DE QUESTÕES**

## 1. Dados Pessoais

- Nome completo: \_\_\_\_\_

**CPF:** \_\_\_\_\_

• Número da Questão: \_\_\_\_\_

- **Solicitação:** Anular questão ( ), Mudar Alternativa Correta ( )

**Justificativa:** \_\_\_\_\_

---

---

---

Digitized by srujanika@gmail.com

---

Digitized by srujanika@gmail.com

---

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

---

Digitized by srujanika@gmail.com

